

당류 섭취 줄이기

1 우리 아이들의 적정 당류 섭취 권고량은?

- 세계보건기구(WHO)의 당류 섭취에 대한 권고 및 한국인 영양소 섭취기준을 토대로 산출한 '가공식품을 통한 당류 섭취 권고량'은 총 섭취 열량의 10% 이내로 다음과 같음

연령	열량(남자 기준)	1일 섭취 권고량	한 끼당 당류 적정 제공량
만 1~2세	900kcal	22.5g	7.5g
만 3~5세	1,400kcal	35g	11.6g
만 6~8세	1,700kcal	40g	13.3g
만 9~11세	2,000kcal	50g	16.7g
만 12~14세	2,500kcal	62.5g	20.8g


* 가공식품을 통한 당류 섭취량은 가공식품과 조리 중 첨가되는 설탕, 물엿, 시럽, 꿀 등의 당류를 말함

- 가공식품 : 음료류, 설탕, 기타 당류, 빵·과자·떡류, 가공 우유, 장류, 드레싱, 김치류, 절임식품, 캔디 등



각설탕 1개 = 약 3g

2 당류 과잉 섭취 시 문제점



충치



비만



주의력 결핍과 과잉행동 장애

3 당류 섭취량을 줄이는 실천 방법

STEP1 식재료 구매

1



가공식품보다는 자연식품을 구매

2



가공식품 구매 시 당류 함량을 확인·비교하여 당이 적은 식품을 구매

3



신선한 식재료를 구매하고 보관 방법을 지킴

STEP2 조리

1



신선한 식재료 사용으로 본연의 맛을 살려서 조리

2



자연식품의 단맛을 활용

3



단맛을 내는 첨가당 사용량을 줄임

4



첨가당은 조리 마지막 단계에 넣어 단맛은 높이고 사용량은 줄임

STEP3 배식

1



소스나 드레싱은 찍어 먹을 수 있도록 배식

- 케첩 등 소스는 음식에 직접 부어 배식하지 않고 찍어먹을 수 있도록 하여 상대적으로 그 양을 적게 섭취할 수 있도록 함

2



구멍 뚫린 배식용 스푼을 사용하여 배식

- 구멍 뚫린 스푼을 사용하면 양념 국물 및 소스의 양을 줄일 수 있음
- 고기와 버섯, 채소 위주로 배식을 하면 당류 섭취량을 줄일 수 있음

